

指標說明&健保VPN上傳欄位

國立成功大學附設醫院藥劑部
黃千惠組長

上傳欄位與說明

欄位	資料名稱	屬性	中文名稱/資料說明
pharm01	醫事機構代碼	X	衛生署核可之醫事服務機構代碼
pharm02	院別	X	不同院區以:A、B、C... 區格(請參考ICU上傳格式)
pharm03	交付機構代碼(醫院免填)	X	簽有備忘錄社區藥局填寫
pharm04	藥師執行照護年月日	X	藥師執行照護日期 (1)第1、2、3碼為民國年份，不足位者前補0。例如民國99年為099。 (2)第4、5碼為月份，不足位者前補0。例如5月，為05。 (3)第6、7碼為日期，不足位者前補0。例如9日，為09。 (4)執行照護日期不可大於結案日期。
pharm05	評估藥師身分證字號	X	輸入A123456789，國民身分證統一編號或外籍居留證號碼(如無居留證號碼請填護照號碼)
pharm06	個案身份證號	X	如為A123456789則輸入A123456789，國民身分證統一編號或外籍居留證號碼(如無居留證號碼請填護照號碼)

上傳欄位與說明

欄位	資料名稱	屬性	中文名稱/資料說明
pharm07	照護收案分類	X	依本次藥師執行照護選擇項次。 1: P6814C: AKD新收案 2: P6815C: AKD追蹤 3: P3414C: CKD新收案 4: P3415C: CKD定期追蹤 5: P3416C: CKD年度追蹤
pharm08	pCKD收案條件	X	• AKD收案 (1:有, 0:無) • 品項大於≥ 10項(1:有, 0:無) • 有使用NSAIDs (1:有, 0:無) • >2項共病 (1:有, 0:無) • 其它 (1:有, 0:無)
pharm09	檢驗日期	X	個案在院所實際檢驗的日期 (1)第1、2、3碼為民國年份，不足位者前補0。例如民國99年，為099。 (2)第4、5碼為月份，不足位者前補0。例如5月，為05。 (3)第6、7碼為日期，不足位者前補0。例如9日，為09。
pharm10	GFR	9(3)	整數3位， 以MDRD-S公式計算，單位：ml/min/1.73 m²，如50.16 ml/min/1.73 m²，則輸入050

上傳欄位與說明



欄位	資料名稱	屬性	中文名稱/資料說明
pharm11	影響腎功能藥品	X	- 顯影劑(14天內) (1:有, 0:無) - CNIs (1:有, 0:無) - Lithium (1:有, 0:無) - co-trimoxazole (1:有, 0:無) - 抗病毒劑 (1:有, 0:無) - 其它腎臟毒性藥品 (1:有, 0:無) 可複選!
pharm12	6-1-1服藥配合度分數 (ARMS)	X	12~48分，未執行填「無」
pharm13	其它 -OTC/保健(健康)食品	X	Y:有 N:無
pharm14	其它 - 中藥、草藥	X	Y:有 N:無

上傳欄位與說明

欄位	資料名稱	屬性	中文名稱/資料說明
pharm15	6-1-2 近期有使用NSAID	X	Y:有 N:無
pharm16	關鍵疾病診斷碼	X	Y:有關鍵疾病診斷碼(乾癬性關節炎 或 類風濕性關節炎 或 退化性關節炎) N:無

上傳欄位與說明

欄位	資料名稱	屬性	中文名稱/資料說明
pharm17	醫師或其他醫事人員是否接受	X	Y: 接受建議 N: 不接受 O: 持續追蹤用藥反應
pharm18	6-1-3 藥師藥事指導	X	A: 疾病自我照顧 (1:有, 0:無) B: 用藥知識及藥物使用指導 (1:有, 0:無) C: 指導用藥技巧 (1:有, 0:無) 可複選! D: 避免藥物腎傷害(AKD收案重點衛教) (1:有, 0:無)

指標自動計算

pharm03	pharm06	pharm07	pharm12	pharm15	pharm17	pharm18
藥師執行 照護年月 日	病人身份證 字號	收案分類	6-1-1服藥 配合度分 數(ARMS)	6-1-2近期 有使用 NSAID (回 顧雲端藥 歷3個月 內)	醫師或其他醫事 人員是否接受	6-1-3藥師藥事指導
1100701	H123456789	CKD新收案	14	Y	Y: 接受建議	D: 避免藥物腎傷害 (AKD收案重點衛教)
1100928	H123456789	CKD定期追蹤	12	N	Y: 接受建議	B: 用藥知識及藥物使 用指導
1110707	H123456789	CKD年度	無	N	0: 本次無建議	C: 指導用藥技巧

年度指標追蹤計算說明

藥事照護指標項目	分子	分母
★ A. 服藥配合度提升	後測____(分)-前測:____(分) 或 ☐ ARMS=12	Pre-ESRD 藥事照護人次
★ B. NSAID 使用減少比率 ^[註]	(a)新收案近期有使用 NSAID 人次	(c)藥事照護新收案人次
	(b)定期追蹤與年度評估有使用 NSAID 總人次	(d)定期追蹤與年度評估藥事照護總人次
本年度有使用 NSAID 請註記: ☐ 新收案，追蹤: ☐ 定期 1 ☐ 定期 2 ☐ 年度， ☐ 本年度皆無		

[註]: NSAID 使用減少比率 : $a/c(\%) - b/d(\%)$

目標 ~ 減緩慢性腎病惡化

用藥配合

提升病人服藥順從性，減緩慢性腎病之惡化。

衛教執行

導入用藥與生活結合，達到共病穩定治療。

整合用藥

清楚病人非處方用藥、中草藥及保健食品，避免不適當使用導致腎病惡化。

避免腎傷害

善用用藥整合，進行處方判斷性介入，避免藥物不良反應及降低健保用藥醫療支出。

追蹤指標：

✓ 配合度量表、 ✓ NSAID使用、整合用藥成效 (中/草藥、介入&追蹤)...