


倍拉維 Paxlovid 用藥須知



適用對象：以下三點皆符合的 COVID-19 患者

- 1**  **發病時間**
發病 **5 天內**
- 2**  **症狀嚴重程度**
具有**重症風險因子**之
輕度至中度新型冠狀病毒疾病
- 3**  **年紀**
12 歲以上
且體重至少 40 公斤

服藥的方式




每盒含有 5 日劑量卡
並以顏色區分**白天和晚上**的錠劑

連續 **5 天**，每日早晚共 **2 次**

可隨餐或空腹服用
請整顆吞服，切勿咀嚼、分開或壓碎

五日連續治療紀錄（服藥後可打勾畫記）



如果您的肝或腎功能不佳，請依醫師指示參考以下服用劑量建議

	輕度	中度	重度	
肝功能不佳	正常服用	正常服用	不建議服用	正常服用 每次服用完整三顆 含 2 顆 Nirmatrelvir 1 顆 Ritonavir ↓ 減少每次劑量 每次服用完整兩顆 含 1 顆 Nirmatrelvir 1 顆 Ritonavir
腎功能不佳	正常服用	減少每次劑量 (見右表說明)	不建議服用	

! 開始服用藥物後，務必遵照醫囑**完整服用 5 日抗病毒療程**，
才能達到最大清除病毒的效果、避免重症及死亡之風險。

忘記服藥別驚慌！



忘記服藥 8 小時內
可盡快補服



若已超過 8 小時
則按照常規原定時間服用下一劑即可
切勿為了補足劑量而服用雙倍劑量藥品

服藥前，請記得告知醫療人員以下事項 (可打勾畫記)



您是否有任何過敏史或有任何嚴重的疾病 (例如腎臟或肝臟疾病)？



您是否已懷孕或計劃要受孕？



您是否正在餵哺母乳或計劃餵哺母乳？



您是否正在服用避孕藥丸？

倍拉維 Paxlovid 可能會影響避孕藥丸的作用。
建議使用替代的避孕方法或不進行性行為。



您正在使用的任何藥物 (包括處方藥、非處方藥、維他命或中草藥製品)

倍拉維 Paxlovid 會和某些藥物產生交互作用，影響治療效果，請告知您的主治醫師目前正在使用的藥物，如高血脂、心律不整、癲癇和免疫調節劑 (如：HIV 藥物) 等。

告知資訊越完整，越有助於醫療團隊為您安排適合的治療喔！

服藥後可能會有的副作用

每個人對於藥物的反應不盡相同，您不一定會出現副作用，但也有可能出現以下反應：

1. **肝臟問題病徵**：食慾不振、皮膚和眼白發黃 (黃疸)、尿液顏色變深、糞便顏色變淺、皮膚發癢
2. **其他**：味覺改變、腹瀉、高血壓、肌肉痠痛

*若產生皮疹、蕁麻疹、聲音嘶啞、呼吸困難或其他過敏反應的嚴重不適，請先停止藥物，並請立即聯絡您的醫療團隊。

藥物貯存方式

請貯存於 **25°C 以下**

