

傳欣乳膏 1毫克/公克

Trancine Cream 1mg/gm

Each gm contains :

【主成分】：Triamcinolone Acetonide.....1mg

【賦形劑】：Lanoline、Stearyl Alcohol、Cetyl Alcohol、Paraffin、
Isopropyl Myristate、PEG 400、Triethanolamine、
Methyl Paraben、Propyl Paraben、Spearmint Oil、
Polyethylene Glycol 4000、Rose Oil、Purified Water

【適應症】：急慢性皮膚症諸如：日曬、異位性皮炎、接觸性皮炎、
手足之濕疹、濕疹性皮炎、嬰兒濕疹、脂漏性皮炎、
皮膚搔癢症、尿布疹、慢性單純性苔癬、乾癬神經
性皮炎。

【用法用量】：少量塗於患部，每天3-4次。
本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】：本劑對皮膚之病毒性感染諸如水痘、水痘不得使用。
個人如對任一本劑主成份有過敏者不得使用。

【注意事項】：本劑不得用做眼科製劑並對鼓膜有穿孔者用於耳部。
(依文獻記載) 對血液循環有顯著障礙者局部副腎皮質類固醇劑不得
使用。如發現有刺激作用，應即停藥並採適當措施。
如有感染，適當之抗黴菌劑或抗菌劑應予使用。如未
能立即獲得良好療效時應將副腎皮質類固醇劑仍用以
迄感染獲得適當控制。
如用於廣泛部位或採用密封裹紮療法時，應對增加副
腎皮質類固醇全身性吸收之可能及適當之注意措施加
以顧慮。
雖對孕婦局部用副腎皮質激素製劑之引起副作用迄未
見報告，但對懷孕患者使用之安全性尚未確立。

【副作用】：偶見局部不能耐受之情形，通常於塗抹部發生搔癢或刺
激。
(依文獻記載) 在密封裹紮部位之敷料下有時能引起粟粒疹、毛囊炎及
膿皮症。
限局性皮膚萎縮、摺紋之發生於密封裡紮療法亦曾見諸
報告。

【包裝】：1000公克以下鋁管、塑膠罐裝。

【貯存】：25°C以下。



美西製藥有限公司
高雄市仁武區工業一路九號

